



健康診断のご案内

あなたの健康・・・

大切なご家族のために・・・



医療法人 桂名会 木村病院

健康診断、うけてますか??

会社に勤めている方は年1回の健康診断受診が義務付けられています。しかし、会社の健康診断では検査項目が限られている場合も多く、体全体をチェックするには限界があります。病気によっては、初期の段階では自覚症状が無いものもあり、症状が現れた時には病気が進行している場合もあります。



病気の「早期発見・早期治療」はあなた自身とあなたの家族を守るために大切なことです。

年1回は健康診断、人間ドックを受診されることをお勧めいたします。



基本ドック

一般的な検査項目での健診コースです。
基本ドックと、気になる項目を追加しての
受診も可能です。

検査代金 10,000円（税抜）



検査項目

問診 診察	
身体計測	身長 体重 BMI 腹囲測定
尿検査	蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン ビリルビン
便検査	便中ヒトヘモグロビン
視力検査	
聴力検査	1000Hz 4000Hz
血圧測定	
心電図検査	12誘導
胸部X線検査	

検査項目

血液検査	血液一般検査	白血球数 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板数 MCV MCH MCHC
	肝機能検査	AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP LDH 総蛋白 アルブミン ZTT TTT LAP ALP 総ビリルビン コリンエステラーゼ
	脂質検査	TG(中性脂肪) HDL-コレステロール LDL-コレステロール 総コレステロール
	腎機能検査	尿酸 BUN(尿素窒素) クレアチニン
	膵臓機能検査	血清アミラーゼ
	糖代謝検査	空腹時血糖 HbA1c



脳ドック(脳卒中)

検査だけ受けて、後日結果をご郵送!!

お手軽に脳ドックを受診してみませんか？脳ドックでは主に脳の血管が破裂する「脳動脈瘤」、血管が血の塊で詰まる「脳梗塞」そのほか「脳腫瘍」「脳萎縮」などを調べることができます。

当院では2014年に1.5テスラ高磁場超伝導MRI検査器材へ変更致しました。このことにより、より鮮明な画像を提供できるようになりました。

脳ドックは次のような方にお勧めです

- 高血圧・糖尿病・高脂血症・不整脈・心臓病などの既往がある方
- 中高年の方
- 脳梗塞・くも膜下出血・脳出血など脳の病気にかかったことがある家族や親せきがいる方
- 肥満の方 ● 喫煙者 ● お酒を飲む機会の多い方
- 物忘れが多い・最近忘れっぽくなった方
- 頭痛や頭が重い感じが続いている方 など・・・



ベーシック 27,000円
(税抜)

【検査項目】

頭部MRI MRA 頸部MRA

スタンダード 40,800円
(税抜)

【検査項目】

頭部MRI MRA 頸部MRA

頸動脈超音波検査

脳梗塞リスクマーカー（血液）



MRI検査は、強力な磁石のトンネルに入り、磁気と電波を使用して人体の任意方向の断面像を撮影します。

X線を使用しない検査なので被曝をしません。

※検査を受ける際に注意事項がございます。

MRA検査とは・・・

MRA検査は造影剤を使用しないで血流を使用して血管を映し出す検査です。脳動脈瘤や血管の狭窄などの診断に利用されます。



ドックで見つかる動脈瘤はほとんどの場合、症状のない数ミリ程度のものが多く、専門医に相談し、適切に対処すれば問題はないものが多いです。

もの忘れドック

検査代金 30,000円（税抜）

検査だけ受けて、後日結果をご郵送!!

年齢とともに忘れっぽくなる、記憶力の低下は個人差はありますが、多くの人にみられるようになります。近年、高齢社会化とともに、もの忘れや認知症の方が増えてきています。認知症とは脳に後戻りができない変化が起こることで発症します。変化が起きた場所によって今まで行えていたことが出来なく状況が生じます。そのことで日常・社会生活に支障が起こるようになった状態を認知症と言います。

もの忘れドックは次のような方にお勧めです



- 50歳以上の方
- もの忘れがある・最近忘れっぽくなったと感じる方
- 同じ話を繰り返ししてしまう・周りの人から同じ話をすると指摘される
- 自分では気づいていないが、周りの人からミスが多いなどの指摘をされるようになった
- 現時点での認知症のリスクを知りたい方 など・・・



頭部MRA MRI検査に加え「VSRAD」を行います

「VSRAD」 とは

Voxel-based Specific Regional analysis system for Alzheimer's Diseaseの頭文字をとって早期のアルツハイマー型認知症診断に用いられるシステムの事です。アルツハイマー型認知症は脳の「海馬」「海馬傍回」の委縮からはじまります。「VSRAD」はこの「海馬」「海馬傍回」の委縮画像を分析して早期のうちにアルツハイマー型認知症を発見します。



認知症は早期発見・早期治療が大切です。

アルツハイマー型認知症は、放置していると進行していきます。明らかな症状が出る頃には、脳がだいぶ萎縮してしまっていることが多く、現時点では治す方法がありません。しかし、幸いなことに今は進行をゆるやかにする良いお薬があります。このため、認知症という病気は、初期の段階で正しく診断し、治療により進行を遅くすることが重要となります。

骨粗しょう症ドック

検査代金 10,000円（税抜）

検査だけ受けて、後日結果をご郵送!!

骨粗しょう症ドックは、骨密度（骨の骨量）を調べて、骨粗しょう症の予防・早期治療に役立てる健診です。

骨粗しょう症ドックは次のような方にお勧めです

- 50歳以上の方
- 閉経後の方
- お酒を飲む機会が多い方
- ご家族（血縁者）に骨粗しょう症の既往がある方
- 過去に骨折をしたことがある方
- 若い時から身長が4cm以上低くなっている方
- 喫煙者
- カフェインをたくさん取る方
- リウマチ、糖尿病、腎臓病の方
- ステロイドを服用している方

など・・・

骨粗しょう症とは・・・

骨の密度が少なくなって、骨折リスクが大きくなる病気のことです。

骨粗しょう症になると骨の中がスカスカになってもらくなり、ちょっとしたことで骨折しやすくなります。

骨粗しょう症患者さんは約1,300万人、その多くは未治療の方が多いといわれています。

また、寝たきりの方の多くは骨折が原因の場合が多いです。1回骨折すると繰り返し骨折を起こす可能性もあります。骨粗しょう症骨折が良く起きる場所は脊椎、股関節、肩関節、手関節、などですが、その中でも脊椎、股関節での骨折は寿命も短くするといわれています。そのため、早期の予防・治療が重要になります。

FRAXにより今後10年の骨折リスクを計算します。
FRAXは世界保健機構（WHO）が開発した診断ツールです。

①は骨粗しょう症骨折が起こる率
②は大腿骨近位部骨折が起こる率を示しています。

60 160

取り消し 計算する

8: 23.4
The ten year probability of fracture (%)

BMDなし

1 Major osteoporotic	5.3
2 Hip fracture	0.5

【検査項目】

身長・体重測定
問診（FRAX）
骨密度（腰椎・大腿骨）
血液検査
生化学
骨吸収マーカー
骨形成マーカー

骨密度検査結果

検査番号: 身長: (cm) 収集部位: 腰椎
名前: 様 体重: (kg) ステータス: 標準
性別: 女性
年齢: 検査年月日: (火) 12時39分
生年月日: 病院名: 医療法人桂名会 木村病院

コメント: 次回の検査は平成29年7月です

骨密度画像		骨密度		
		骨塩量	骨面積	骨密度
L2		8.913	12.325	0.723
L3		12.137	13.189	0.920
L4		15.778	16.435	0.960
L234		36.792	41.949	0.877
		(g)	(cm ²)	(g/cm ³)

標準値: 77 [1.234]

(g/cm³)

骨密度

年齢

判定

あなたの骨密度（骨塩量）は 0.877 (g/cm³) です。
これはあなたと同じ年齢の平均骨密度と比較して、113 (%)に相当します。
また、若年成人の平均骨密度と比較すると、82 (%)に相当します。

あなたの骨密度は、同年齢の人と比べて同等といえますが、若年成人の平均骨密度と比べるとやや低下しています。
バランスの良い食事や適度な運動を心がけましょう。
定期的に検査を受けてください。

T: -1.5 (SD)

呼吸器の検査

次のような方にお勧めいたします

- 喫煙している40歳以上の方
- 喫煙指数（1日の喫煙本数×煙草を吸っている年数）が600以上の方
- がんにかかったことがある家族や親せきがいる方
- 胸部X線撮影検査で異常があるといわれたことがある方
- アスベストや粉じん、繊維などを扱う仕事についていたことがある方

など・・・・・・・・


胸部CT検査

10,000円（税抜）

胸部CT検査（コンピュータ断層撮影）とは、X線で撮影した体内の様子をコンピュータで解析し、胸部を断面図にして臓器の様子を見る検査です。

胸部X線で肺がんなど胸部の病気の疑いがあると診断された場合にもより詳しく調べるためにおこなわれます

肺がんのほかにも、肺結核、胸部大動脈瘤など、胸部X線撮影検査ではわかりにくい、肺・胸部の小さな病変を発見することが出来ます。



喀痰細胞診検査

2,000円（税抜）

痰を採取して、その中にどのような病的な成分が含まれているかを顕微鏡で観察する検査です。痰を出して調べます。肺がんは、痰の中にがん細胞が排出されることも多く、肺がん診断の1つとして行われます。

検査に出す痰は、毎朝起きたときに3日続けて取ります。

痰を取るときには、必ずうがいをして口の中をきれいにします。これは食物の残りかすなどが痰の中に混ざり、がん細胞との鑑別が難しくなることがあるからです

※検査を受ける患者様へ

【痰の取り方】

痰を取る前にうがいをして、口の中をゆすいでください。
容器のふたを開けて、痰を入れてください。
痰を容器に入れたら、ふたをしっかり閉めて密閉容器に保管してください。
なるべく早めに病院へ提出してください。

平日（月～金） 9:30～18:30
土曜日 9:00～12:30
日・祭日 お受け取りできません。

【呼吸器科の痰の取り方】

スゴイト容器：
スゴイトとキャップを外し、キャップに痰を取り、スゴイトで吸い上げてください。キャップをして提出してください。

赤キャップの容器：
ふたを取り、容器に痰を入れてください。

青キャップ容器とスゴイトのセット：
スゴイトの先端に痰を入れてください。青色キャップの容器と一緒に提出してください。

白キャップの容器：
痰を容器に入れています。痰をこぼさないように注意してください。
容器は1つですが、1日1回3日分を続けてください。

肺機能検査

1,500円（税抜）

肺の容積や空気の換気能力を調べる検査。
次の項目を調べます

肺活量：空気を胸いっぱい吸い込み、全て吐き切った時にどれだけ多くの空気を吐き出せたかを調べます。

%肺活量：年齢や性別から算出された予測肺活量（基準値）に対しての、実測肺活量の比率を調べます。

努力性肺活量：胸いっぱいに息を吸い込み、一気に吐き出した空気の量を調べます。

1秒量：努力性肺活量のうちの最初の1秒間に吐き出された空気の量を調べます。

1秒率：努力性肺活量に対する1秒量の比率を調べます。

残気量：息を吐ききった後、肺どれだけの空気が残っているかを調べます

消化器の検査

次のような方にお勧めいたします


- 胃の痛みやむかつきがある方
- 食べ物が飲み込みにくい感じがある方
- がんにかかったことがある家族や親せきがいる方
- ピロリ菌が心配な方 ● 肥満の方 ● お酒を飲む機会が多い方
- 便秘気味、便が細くなった

など・・・・・・・・

上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）

14,000円（税抜）


内視鏡を経口、経鼻で挿入し、食道～胃～十二指腸を観察する検査です。
必要時には粘膜の組織を取る検査（生検）やポリープ切除を行うことも出来ます。



胃X線検査（胃バリウム検査）

7,000円（税抜）

食道、胃、十二指腸の病変を、バリウム（造影剤）を飲んで写し出す方法です。発泡剤で胃をふくらませたあとで、バリウムを含む造影剤を飲んで行う検査です。検査台の上で身体を動かし、胃の粘膜全体に造影剤を行き渡らせながら胃の内部を観察する検査方法です。





検査の目的は、胃がんの早期発見です。潰瘍、その他の病気の検査も目的としています。

下部消化管内視鏡検査（大腸カメラ）

20,000円（税抜）

肛門から内視鏡を挿入し、大腸の粘膜に生じた病変を直接観察する検査で、下部消化管内視鏡検査とも呼ばれています。同時に生検用の組織を採取したり、ポリープを切除したりすることもあります。




大腸X線検査（注腸検査）

10,000円（税抜）

大腸（直腸・結腸）に造影剤を注入し、X線撮影をして詳しく調べる検査のことで、下部消化管X線検査ともいいます。大腸がんの症状は、血便や便通異常、腹痛などです。とくに血便は重要で、肉眼で分かる血便や、便潜血反応で初めて分かる見えない血便まであります。

大腸がんのほか、大腸ポリープ、クローン病、潰瘍性大腸炎、大腸憩室などがこの検査で診断できます。



循環器の検査

次のような方にお勧めいたします

- 心筋梗塞など、心臓の病気にかかったことがある家族や親せきがいる方
- 血圧や糖尿病、高脂血症などで治療を受けている方
- 肥満の方 ●煙草を吸っている方
- 動悸、脈がみだれるなどがある方

など・・・

心臓超音波検査

5,000円（税別）


心臓超音波検査（心エコー）とは、人の耳には聞こえないほどの高周波数の超音波を心臓に発信して、返ってくるエコー（反射波）を受診し、心臓の様子を画像に映し出して診断する検査です。

心臓超音波検査で何がわかるのか？

この検査を行なう目的は二つあり、一つは心臓の形の異常を発見する形態的診断、もう一つは心臓の働きを見る機能的診断です。

特に、心臓は常に拍動していますが、その動いている状態をそのまま観察できる、とても有用な検査です。

心室や心房の大きさや壁の厚さ、壁の動き、弁の形態や動きなどがわかります。カラードップラー法を行なうと、心臓の中の血液の流れを映し出すことができ、弁の異常や壁に穴があいているかどうかなどの異常を発見できます。





負荷心電図検査

3,500円(税抜)

心電図検査は安静に保ちながら行いますが、運動で心臓に一定の負荷（負担）をかけつつ、あるいはその直後に行い、心臓の筋肉の変化を観察するのが負荷心電図検査です。

普段は特に症状が無いのに運動中・仕事中に狭心症の症状が出ることがありますがこのような狭心症の疑いがある場合に心臓での酸素需要を高め、心筋に酸素が十分供給されない状態を意図的に作ることによって異常の有無を調べることができます。

また、通常的心電図検査で異常があったときや、運動中の胸痛、不整脈などの症状があるときにも行われる検査方法です。



ホルター心電図検査

9,000円(税抜)

ホルター心電図は、小型の器械を体につけて、日常生活の長時間の心臓の動きを記録して、これを解析する検査です。短時間の心電図検査や負荷心電図検査では診断が付きにくい不整脈や狭心症などの診断に用いられます




その他の検査

ABI検査

2,000円(税抜)

手・足の血圧の比較と脈波の伝わり方を調べて、動脈硬化の程度や血管障害を早期に発見することが出来ます。
ベッドに横になって手足の血圧測定を行う検査です。
動脈の内膜にコレステロールを主成分とする脂質が沈着すると内膜が厚くなります。

血管内に粥状硬化ができて内腔が狭くなる「アテローム動脈硬化」の進行程度、血管の狭窄や閉塞などが推定できます。




頸動脈超音波検査

3,500円(税抜)

頸動脈超音波検査は視覚的に動脈硬化の診断を行える検査方法です。動脈硬化を起こすと血管の壁が硬くなったり厚くなったりして柔軟性が損なわれます。痛みも被曝もありません。

1mmを超える限局性の壁隆起をプラークと言います。プラークがはがれる、壊れることで脳梗塞を起こす原因となることがあります。超音波検査ではプラークの大きさや形状などの観察をします。



内臓脂肪測定検査


内臓脂肪測定検査のみ3,000円(税抜)
腹部CT検査+内臓脂肪測定検査 11,500円(税抜)

内臓についた脂肪が体に、様々な悪影響を及ぼします。
ウエスト周囲(へそまわり)が、女性では90cm以上、男性では85cm以上であれば、要注意です。
内臓脂肪が増えると、さまざまな病気が引き起こされる原因になります。


○メタボリックシンドロームとは・・・

内臓の周囲に脂肪が蓄積する内臓脂肪蓄積型の肥満を持った人が、高血圧・高脂血症・糖尿病といった動脈硬化危険因子を2つ以上合わせもった新しい疾患概念をいいます。

メタボリックシンドロームの人は、糖尿病を発症するリスクは通常の7~9倍。心筋梗塞や脳卒中を発症するリスクは約3倍とされています。



内臓脂肪CT検査報告書

検査日	
氏名	様
生年月日	患者番号
性別	
身長	cm
体重	kg
平素より当院をご利用いただきありがとうございます。 内臓脂肪検査の結果をご通知申し上げます。	
[測定結果]	
	内臓脂肪面積 28.0 cm ² 皮下脂肪面積 135.1 cm ² 腹囲(CT) 75.1 cm 内臓/全体脂肪比 0.17 皮下/全体脂肪比 0.83 内臓/皮下脂肪比 0.21 体格指数(BMI) 20.8 [参考] BMI=体重kg/(身長m) ² ~18.4 18.5~24.9 25.0~29.9 30.0~ やせ 普通 肥満 高度肥満
[内臓脂肪] 正常 腹囲(CT) 75.1cm (BMIが25以上で、男性85cm、女性90cm以上は上半身肥満の疑い) 内臓脂肪面積 28.0cm ² (男女とも100cm ² 以上で内臓脂肪型肥満の疑い) [体格指数(BMI)] 普通 理想体重 50.4kg (現在の体重は、2.8kg不足です) [総合判定] 異常なし [コメント] あなたの内臓脂肪は正常範囲内です。今の体重を維持するよう心がけてください。今後ウエストサイズが変わらなければ、この検査をお受け頂く必要はありません。	

医療法人 桂名会 木村病院
電話 052-781-1119

その他の検査

24時間血圧測定

2,000円(税抜)

血圧測定は、病院でもご家庭でも測っているそのときの状態しか知ることができません。そのため、たとえその測定時に正常でも、測っていない時間帯で血圧が高くなっている、いわゆる**仮面高血圧**を見逃してしまう可能性があります。

仮面高血圧を見つける方法として、24時間の血圧を連続測定する、ABPM 24時間自由行動下血圧測定があります。ABPMで用いられる血圧計は、医師から必要な人に貸し出した器械で測定します。腕に巻くカフと、データを記録するために腰に装着する測定装置を装着します。これを付けて1日を過ごし、15～30分ごとの血圧を自動的に記録することで、通常の血圧測定では知ることのできない環境や時間帯での血圧を確かめられます。

ABPMを実施するメリットとして、具体的には次のようなものがあります。


- 測定回数が多く、より実際に近い測定結果を得られます。
- 仮面高血圧として分類される早朝高血圧、夜間高血圧、職場高血圧を含むストレス下高血圧を判断します。

また、病院に来ると血圧が上がる「白衣高血圧」なのか普段から血圧が高いのかも判断できます。

腹部CT検査

10,000円(税抜)

腹部の横断面に多方向からX線を照射し、コンピュータ処理によって鮮明な横断画面線を描き出します。肝臓や胆嚢、脾臓など内視鏡で観察できない腹部臓器の病変を診断する際に有効です。



腹部超音波検査

5,000円(税抜)

腹部超音波検査（腹部エコー）とは、人の耳には聞こえないほどの高周波数の超音波が臓器から返ってくるエコー（反射波）を受診し、画像して映し出し診断する検査です。



ABC検診

4,500円(税抜)

ABC 検診とは、ヘリコバクターピロリIgG抗体（Hp抗体）検査でピロリ菌感染の有無を、ペプシノゲン（PG）検査で胃粘膜萎縮度を調べ、その結果を組み合わせることで胃がんのリスクをA, B, C, Dの4群に分類して評価する検診です。

ヘリコバクターピロリ（H.ピロリ）抗体検査
H.ピロリ菌は胃粘膜にダメージを与え、さまざまな病気の原因になるとされます。

ペプシノゲン検査
胃粘膜の老化（萎縮）の状態を調べる検査です。萎縮が進んだ胃はがんになりやすいといわれています。

眼底カメラ検査

1,500円(税抜)

瞳孔の奥にある眼底を、レンズを通して観察し、眼底の血管、網膜、視神経を調べる検査です。網膜剥離や眼底出血、緑内障などの目の病気を調べる時に行ないます。

網膜の病気だけではなく、動脈硬化の進み具合がわかります。眼底には脳へと繋がる視神経の出入り口がありますので、脳内の血管の状態を推測することで、脳の病気や診断にも役立ちます。



脳梗塞リスクマーカー

9,000円(税抜)

血液検査で脳梗塞のリスクを評価します。無症状性脳梗塞（隠れ脳梗塞）の可能性を検査します。約85%の検出が可能とされています。

がんが気になる方へ

腫瘍マーカーの検査

血液を採取して検査ができます。

体内に腫瘍ができると、その腫瘍特有の物質が作られます。基本の血液検査に追加して行うことができます。検査時間は変わりません。気になる項目を追加できます。

男性用・女性用の腫瘍マーカーセットもご用意しております。

CA15-3(女性のみ)

乳がんの特異性の高い腫瘍マーカーです。初期の段階での有用性は低く、再発・転移に有用な検査です。

PIVKA II

肝臓に異常が生じることによって血液凝固因子が生産できなくなり、PIVKA IIが多く生産されます。これはおもに肝臓がんによって生じるため、肝細胞がんの腫瘍マーカーとして利用されます。

AFP

原発性肝がんの早期発見に有用です。慢性肝炎や肝硬変でも高値となります。

CA125(女性のみ)

卵巣がん、子宮がんの腫瘍マーカーです。

SCC抗原

扁平上皮癌（肺がん・気管支・食道・子宮頸がんなど）で陽性率が高い。

CYFRA(シフラ)

肺扁平上皮がんでは早期から陽性率が高い腫瘍マーカーです。その他、腺がん、大細胞がんなどでも陽性率が上昇します。

CA19-9

消化器系がんの腫瘍マーカーとして用いられていますが、なかでも膵臓、胆管、胆嚢がんのときには数値が顕著に高くなります。

CEA

消化器系（胃・膵臓・大腸）主に胃がん、大腸がんがある場合に高い数値を示すようになりますが、膵臓がん、肝臓がんなどのほかの臓器のがんや、肝硬変、肝炎、胃潰瘍などでも高い数値を示すことがあります。

PSA (男性のみ)

前立腺に特異的にみられる腫瘍マーカーです。高値の場合には前立腺肥大・前立腺がんが疑われます。

肝細胞がん・肝臓にできるがんで、原発性の肝臓がんのことをいいます。肝細胞がんの約60%はC型肝炎ウイルス（HCV）によるものです。
扁平上皮がん・皮膚や口、食道、肺、前立腺、子宮など、様々な臓器に発生する悪性腫瘍のことです。
非小細胞がん・肺がんの約80%を占めるがんです。

男性用腫瘍マーカーセット
3,500円

CEA SCC抗原 AFP
CA19-9 PSA

女性用腫瘍マーカーセット
3,500円

CEA SCC抗原 AFP
CA19-9 CA125


遺伝子検査のご案内

“今がんがあるか”リスク判定

消化器がん マイクロアレイ

80,000円(税別)

9割の感度で消化器がんのリスクを判定します。
小さながんでも早期に発見



胃がん、大腸がん、すい臓がん、胆道がんの検査が対象です。

検査は簡単！！
血液検査5CCで検査が出来ます。

“今大腸がんがあるか”リスク判定


Cologic(コロジック)

16,500円(税別)

内視鏡が苦手な方に・・・

血液検査で大腸がんリスクを評価します。
大腸がん患者の血中で特異的に減少する、長鎖脂肪酸“GTA-446”という物質を測定し、大腸がんのリスクを判別しています。

検査結果レポートサンプル



“今すい臓がんがあるか”リスク判定


Panasee (パナシー)

16,500円(税別)

見つかりにくいすい臓がんを早期にリスク評価をします。

見つかりにくいすい臓がんを早期にリスク評価します。すい臓がん患者の血中で特異的に減少する、長鎖脂肪酸“PC-594”という物質を測定し、すい臓がんのリスクを判別しています

検査結果レポートサンプル



今の動脈硬化のリスクを判定


LOX-index (ロックス・インデックス)

12,500円(税別)

脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクが分かる血液検査です。

ストレスが多い、肥満気味である方
ご家族に脳梗塞・心筋梗塞などの病気をしたことがある人がいる方、
高血圧、高脂血症、糖尿病などの治療をしていて動脈硬化が気になる方
に特におすすめ致します。

検査結果レポートサンプル



プチドック

忙しくて健康診断に行く時間がないけど、体のことが気になる・・・
最近、体調がすぐれない時があるんだけど・・・
食事や運動で生活習慣の改善をしているけど、効果が知りたい・・・
など、体のことで気になることがあるあなたに、プチ健診をお勧めします。
検査時間はごくわずかの時間でできます。
申込みを事前に行っていただき、検査日に受付、検査や採血をして終了です。
検査結果は後日、ご自宅へ郵送いたします。
もちろん、他に気になる検査があれば一緒に受診可能でございます。

セット	説明	内容	料金
肝機能 セット	食べ過ぎ、飲みすぎが気になる方、最近体が疲れやすい方にお勧めです。	総蛋白・アルブミン 総ビリルビン・AST・ALT、 γ-GTP ALP・LDH・HBs抗原、 HBs抗体・HCV抗体	1,000円
糖尿セット	糖尿病は自覚症状がないまま進行していきます。治療をせず放置しているとじわじわ進行していき、眼や腎臓などに影響を及ぼします。	血糖値（空腹） グリコヘモグロビン（HbA1c） 尿糖 尿たんぱく	500円
甲状腺 セット	甲状腺の病気は特に女性に見られます。無症状であることが多いです。悪性の場合には進行が速く、予後も悪い病気もあるため、早期発見・早期治療が大切です。	TSH FT3 FT4	1,500円
ピロリ菌 セット	胃潰瘍、胃炎、胃がんの原因になるとも言われているピロリ菌を血液で調べることができます。	H.ピロリ菌、 ペプシノーゲン	4,500円
リウマチセット	関節リウマチは治療可能な病気です。早期発見・早期治療をお勧めします。	RF 抗CCP抗体	1,500円
貧血セット	血液の中の赤血球やヘモグロビンが不足していることを貧血といいます。貧血になると疲れやすかったり、めまいがしたりします。	末梢血一般 フェリチン 血清鉄	1,000円
コレステロール セット	脂質異常症の検査です。血液中の脂質や中性脂肪が多くなっている病気です。放置すると、血管内の壁に脂が付着して動脈硬化を起こします。さらに心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因になります。	総コレステロール HDLコレステロール（善玉） LDLコレステロール（悪玉） 中性脂肪	500円

価格一覧表（税抜）

ドック各種	
基本ドック	10,000円
脳ドック（脳卒中）（ベーシック）	27,000円
脳ドック（脳卒中）（スタンダード）	40,800円
もの忘れドック	30,000円
骨粗しょう症ドック	10,000円

腫瘍マーカー	
腫瘍マーカーセット（男性用）	3,500円
腫瘍マーカーセット（女性用）	3,500円
腫瘍マーカー SCC抗原	750円
腫瘍マーカー CA19-9	750円
腫瘍マーカー CEA	700円
腫瘍マーカー PSA(男性のみ)	750円
腫瘍マーカー AFP	700円
腫瘍マーカー CA125（女性のみ）	850円
腫瘍マーカー CA15-3（女性のみ）	1,750円
腫瘍マーカー CYFRA	2,500円
腫瘍マーカー PIVKAⅡ	1,000円

遺伝子検査	
消化器がん マイクロアレイ	80,000円
Colpgic（コロジック）	16,500円
Panasee（パナシー）	16,500円
Lox-Index（ロックス・インデックス）	12,500円

価格一覧表（税抜）

項目	検査費用
胸部CT検査	10,000円
喀痰細胞診	2,000円
肺機能検査	1,500円
上部消化管内視鏡検査（胃カメラ）	14,000円
下部消化管内視鏡検査（大腸カメラ）	20,000円
胃X線検査（胃バリウム検査）	7,000円
大腸X線検査（注腸検査）	10,000円
心臓超音波検査（心エコー検査）	5,000円
頸動脈超音波検査（頸動脈エコー）	3,500円
ホルター心電図検査	9,000円
負荷心電図検査	3,500円
24時間血圧測定検査	2,000円
ABI検査（血圧脈波）	2,000円
腹部超音波検査（腹部エコー）	5,000円
ABC検診	4,500円
眼底カメラ検査	1,500円
腹部CT検査	10,000円
内臓脂肪測定検査	3,000円
腹部CT検査＋内臓脂肪測定検査	11,500円

お申込み方法

- お申し込みは電話・受付窓口・ホームページから行えます。
- また、ご予約の変更などは必ず、病院へご連絡いただきますようお願い致します。
- お申し込み時、治療中の病気がある方、お薬を内服中の方は必ず予約担当職員へお申し出ください。
- 検査項目によっては休薬（お薬を飲まない）が必要な場合もございます。
- ご予約後に健診ご案内、健診問診票、検体容器（尿・便）などをご郵送いたします。



受診前日の注意事項

- 健診前日は夕食を21時（午後9時）までに、済ませてください。
- 夕食後の水分についてはお水・お茶（お砂糖・ミルクの含まないもの）は摂っていただいてもかまいません。
- ただし、検査項目によっては飲食の注意事項が異なります。ご予約時にご説明いたします。
- 正確に確実に検査を行うため、ご協力をお願い致します。



お得なセット料金

- 各種ドックコースとオプション検査を同時にお申込みをされますと、合計金額より8%の割引をさせていただきます。
- オプション検査のみをご希望の方には2項目以上の同時お申込みをされますと合計金額より5%の割引をさせていただきます。




受診当日の注意事項

- 健診当日の朝は絶食でご来院ください
- 水分は受診する検査内容によって異なります。
検査説明用紙をご確認ください。
- 喫煙されている方は健診当日は検査が終わるまで煙草を吸わないでください。また、当院敷地内は禁煙となっております。なお、当院建物周辺での喫煙はできませんのでご了承ください。
- 検査項目によっては、腕時計、カラーコンタクト、アクセサリ類、湿布、使い捨てカイロなど、外していただく場合がございます。



受診当日ご持参いただくもの



- 問診票 ● 健康保険証（医療証）
 - 検体容器（尿・便など）
 - 眼鏡（使用している場合）
 - コンタクトレンズケース
- ※コンタクトレンズをご使用の方で眼底カメラ・MRI検査をご希望の方）

検体採取について

- 検便容器は正確な検査結果を得るために、
採取後、4日以内のご提出をお願い致します。
- 採取した検体は冷暗所にて保存していただくことを
お願い致します。
- 検尿容器は健診当日朝に採取してください。



2011.07.01 作成
2012.05.01 改訂（病院移転に伴い住所、電話番号、FAX番号、変更）
2014.12.15 改訂（MRI・骨密度測定検査器材変更に伴い）
2015.06.15 改訂（血液検査項目追加）
2017.01.20 改訂（遺伝子検査項目追加）
2017.04.01 改訂

医療法人 桂名会 木村病院

〒465-0087

愛知県名古屋市名東区名東本通2-22-1

Tel (052)781-1119 Fax (052)781-0119

E-mail : hp.gairai@keimeikai.or.jp

